

سوفتا - مان فيسکوراب محلول للجلد

مواد فعالة:

إيثانول 45 غرام/100 مل وبروپانول 18 غرام/100 مل.

Ethanol 45 g/100 ml and Propanol 18 g/100 ml.

قائمة المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية مفصلة في البند 6.

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر بحسب تعليمات الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

سوفتا - مان فيسکوراب محلول كحولي لتغيم الندين من أجل النظافة وقبل إجراءات جراحية.

المجموعة العلاجية: مواد تعقيم للجلد.

للاستعمال على جلد غير مصاب، الامتصاص عبر الجلد هو قليل جداً ولا يوجد له تأثير على الجسم.

المواد الفعالة في سوفتا - مان فيسکوراب هي إيثانول وبروپانول. المستحضر يحتوي على كل سلالات بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية [مثل، جراثيم مقاومة للميتسيلين Staphylococcus aureus (MRSA)] والمنظرية (mycobacterium) . يوجد سوفتا - مان فيسکوراب فعالية جيدة كفافل للفطريات والفيروسات وهو يبطّل فوراً مفعول فيروسوت ذات غلاف وفيروسوت من نوع فيروس جبلي (روتا - rotavirus).

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:
ووجت لديك حساسية للمواد الفعالة إيثانول أو بروپانول، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 في هذه النشرة).

تحذيرات:

• هذا المستحضر معد للاستعمال الخارجي فقط. امتنع عن أي تلامس مع العينين والأنسجة المخاطية.

• يجب الاستعمال فقط على جلد غير مصاب.

قابل للاشتعال. درجة الاشتعال (flash-point) للمحلول هي 21°. يجب إعادة عن اللهيبي أو كل مصدر آخر للاشتعال.

يُمنع التدخين، يُمنع التبغ.

يُمنع إشعال سيجارة أو التعرض للنار حتى الجافن الثام للمستحضر.

يجب استشارة طبيب، صيدلي أو مرضية قبل الاستعمال.

إذا كنت تتناول أو تتناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

يُمنع خلط المستحضر مع أدوية أخرى.

الحمل والإرضاع

ليس معروفاً عن وجود عواقب ضارة لاستعمال سوفتا - مان فيسکوراب خلال الحمل.

الإرضاع

ليس معروفاً عن وجود عواقب ضارة لاستعمال سوفتا - مان فيسکوراب خلال الإرضاع.

إذا كنت حاملًا أو مرضعة، إذا كنت تعانين إنك قد تكونين حامل أو تخطبين لتخمي، استشيري الصيدلي أو الطبيب قبل استعمال الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

للاستعمال الموضعي.

قم برش ما يقارب 3 مل من سوفتا - مان فيسکوراب غير مخفف التركيز، على بين جانبي.

أفرك اليدين

- لمدة 30 ثانية على الأقل لتعقيم اليدين.

- لمدة 90 ثانية على الأقل لتعقيم اليدين قبل عملية جراحية.

يجب أن يبقى الجلد رطباً لمدة 30 أو 90 ثانية، بحسب هدف التعقيم.

أترك الجلد ليجف.

لا حاجة لغسله.

يمكن استعمال سوفتا - مان فيسکوراب بدون تنظيف مسبق اليدين. إذا كانت اليدين متشنخة، يجب تنظيفها أولاً بالماء والصابون.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا استعملت عن طريق الخطأ كمية أكبر من سوفتا - مان فيسکوراب من الكمية الموصى بها أو إذا بلغت جزءًا، اصل فورًا مع الطبيب، أو الصيدلي.

يُمنع التبلّغ للاستعمال الخارجي فقط.

إذا قام شخص بالغ أو طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، من المحتمل أن يعاني من تسمم كحولي حاد. كهرباء كبيرة من المستحضر يمكن أن تؤدي إلى توقيف التنفس. فقدان الوعي يتطلب على خطير الاحتياط نتيجة التلف.

• توجّه فوراً لغرفة الطوارئ في المستشفى لتلقي علاج طبي وأحضر معك عبوة الدواء.

• يُمنع شحّيج القبّي بدون توصية طبية.

يُمنع تناول الأدوية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال سوفتا - مان فيسکوراب أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدّم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن تتعارى من أي منها.

بما في ذلك ندبات علول للهوبيع جيري محكم شغافه ماللوكول (لوجوما):
جريد، أدمونجوت، بمزيد لأخر شيموشيز خوزيم بسوبطا-من
يسكرواب.

يوش بعور علول للهوبيع بمكرمات ديريم، بعنوان عم لחות نموقة
(بعiquer بوحر). مرحيحة كرم يديم مولفات بمكرمات كاله.
أم الهوبيع توعنة لواي، أم اشت موتوفوت هوبيع شنمצע דרכ הבית
כשר אטה סובל מותופעת לואי שלא צינה בעולן, עלייה להתייעץ
עם הרופא.

יבית לדוחות על תופעות לואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על
הקישור "דיווח על תופעות לואי עלייך טיפול תחופת" (www.health.gov.il)
של אtor משרד הבריאות לואי, או עלייך נספה לkjvor:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התוֹרֶוףָה?

• מען הרעליה! תוֹרֶוףָה זו וכיל תורפה אחרית יש לשמרם במקום סגור
מחוץ ליחסים זדים ואותיהם של ידים / ואו תינוקות ועל ידי כר
תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לאלה הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתוֹרֶוףָה אחריך תורפה רגילה של הקבוקן: 12 החדש, ומל' אוחזון של אוטו
על חווית הקבוקן. לאחרך התוֹרֶוףָה מומיחת יום האוחזון של אוטו
חווש.

• חי-מידך לאחר פתיחה ראשונה של הקבוקן: 25°C. יש שגור את האירה מיד
לאחר התוֹרֶוףָה הרשות על התוֹרֶוףָה.

• יש לאחסן מתחם 25°C-0°C.

• חומר דליק! יש להרחק ממקורות אש.

6. מידע נוסף

• נספח על הרוכבים הפעלים התוֹרֶוףָה מכילה גם:
Purified Water, Butanone, Glycerol, Isopropyl Myristate,
Cetearyl Ethylhexanoate, Edetol, Octyldodecanol, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Bisabolol.

• כיצד נראתה התוֹרֶוףָה ומה תוקן האරזה:
תמייהה לעור, ללוֹלה-מעש עורה, צמגה, עם ריח
אלכוהולי.

התמייה לעור אורה בקבוקים המכילים 100 מ"ל, 500 מ"ל
ו-1000 מ"ל.

הקבוקים סגורים בפקק או במשבתת דיספנסר.

בעיל הרישום:

C.W.T - CHRONIC WOUND TREATMENT LTD., ISRAEL
רחוב הגפן 84, 7313000, ישראל'

• ייצור: ב. בראוון מלסונג AG, מלסונג, גרמניה.

• עליון זה בדק ואישר ע"י משרד הבריאות בנובמבר 2017.

• מספר רישום התוֹרֶוףָה בנקוק התוֹרֶוףָות הממלכית במשרד
 הבריאות: 159-35-35073-00.

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקנירום) התשמ"ו - 1986
התוֹרֶוףָה משוֹקְה לאל מרשם רפואי

סופט-מן ויסקוּראַב תמייהה לעור

חומרים פעילים:

אתנאל 45 גרם/100 מ"ל ופרופאנול 18 גרם/100 מ"ל.
Ethanol 45 g/100 ml and Propanol 18 g/100 ml.

רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים מפורטת בסעיף 6.
קרא בעיון כת העולן עד סופו בטרכם תשמש בתוֹרֶוףָה. עליון זה
מכיל מידע תמצית על התוֹרֶוףָה. אם יש לך שאלות נוספת נספח, פנה אל
הרופא או אל הרוקח.

עליך לשמש בתוֹרֶוףָה כבשורי על פי ההוראות בסעיף המינון בעולן זה.
היעוּן ברוקח אם הנזק למדיע מושך.

1. מה מידעת התוֹרֶוףָה?

סופט-מן ויסקוּראַב הבינה תמייהה אלכוהולי לחיטוי היידיים לשם
היגייניה ולפיכו פעולות ניטוחיות.

קבואה רפואיית: חומר חיטוי לעור.
בשימוש על עור שאינו פגוע, הסוגיה דרכו העור מזערית ואין לה
השפעה על הגוף.

החומרים הפעילים בסופט-מן ויסקוּראַב הינם אתנאל ופרופאנול.
התכשיר יעל מודף חיקיקים גרם חיביים וגרם שליליים, ככל
זנים מודדים לאוניבטי טוקיניקה [לוגומ, יידיקים עמידם למטריצין]
ויסקוּראַב פעולות טוגה כקוטל טריריות ונגייס הוא מושך בתוֹרֶוףָה
ויסקוּראַב עליון מיעט ווגפים מסוג רותה.

2. לפני השימוש בתוֹרֶוףָה

אין לשמש בתוֹרֶוףָה אם:
• אין לך גש (אלרגיה) לחומר הפעיל או פרופאנול,
או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילה התוֹרֶוףָה (ראה
סעיף 6 בעולן).

אדרהות:
• והקשר מידע לשימוש חיצוני בלבד. המגע מכל מגע עם העיניים
ורקמות ריריות.

• של להשתמש בתוֹרֶוףָה (flash-point) של התמייה היא 21°C. יש
להרחק מלחבה או כל מדור אחר להצחתה.

אסור לעשן, אסור לבלוע.
אין להקליך סגירה או להיחשף לאש עד ליישוב מוחלט של התכשיר.

יש להזען בוֹאַרְזֵה או אוחזת פנוי המשמש.
אם אתה לך לוחק, או סמך לארחנה, וריך, או אוחזת פנוי המשמש.

מדוברות לא לוחק, או סמך לקחת לאחנה, וריך, סרף על כר לרופא או לרוקח.
אין לעורב את התכשיר עם תרופות אחרות.

הרין והנקה

לא דיאו על השלכות מזיקות לשימוש בסופט-מן ויסקוּראַב במהלך ההריון.
הנקה:

אם אתה בהריון או מניקה, אם את חותשת שתאי עשויה להיות בתוֹרֶוףָה.
או מתמכנת הרין, הייעשי ברוקח או ברופא לפני השימוש בתוֹרֶוףָה.

3. כיצד תשמש בתוֹרֶוףָה?

לשימוש רקומי.

• פור-3-מ"ל סופט-מן ויסקוּראַב לא מושך על כפות ידים בשות.

• שיטף את הידיים:

- למשך 30 שניות לפחות לחיטוי ידיים הייגני.

- למלט. 90 שניות לפחות לחיטוי ידיים לפיכך.

• עליך להעיר להישאר לה למשך 30 או 90 שניות בהתאם בהתאם
לייעוד החיטוי.

• אין צורך לשוטף.

נתן לתוֹרֶוףָה מילוטר סופט-מן ויסקוּראַב ללא ניקוי מקדים של הידיים.

אם הידיים מילוטר מילוטר, או מילוטר מילוטר, יש לניקות אותן עם מים ובובן תחילת.

אין לזרום על הנהנו של הנהנו המומולטה.

אם השתמש בתוֹרֶוףָה בזירת סופט-מן ויסקוּראַב מהמולץ או אל

אין לזרום על הנהנו של הנהנו בלבד.

אם בטעות בול נבוגר או ילד מתייחס לתוֹרֶוףָה עלול לשבול מרהענות

אלכוהול חיטוי. כוויות דלולות של התוֹרֶוףָה עלולות להוביל לעיצירת

שימשה. איבוד הכרה בכיסוון חיקון כתגובה מהמקאה.

• פנה מיד לחדר מין של בית חולים לשם טיפול רפואי והבא את

אריזות התוֹרֶוףָה אין-

אין לישוט התוֹרֶוףָה בחושן! בדוק התוֹרֶוףָה ומגנה בכל פעם

נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הגר זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוֹרֶוףָה, הייעוץ בروفא

או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסופט-מן ויסקוּראַב עלול לגרום לתופעות
לוואי בחולן המושפעים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות לוואי.

יתכן ולא תסבול אף אחת מן.

BRAUN

Patient leaflet in accordance with the Pharmacists' Regulations (Preparations) - 1986

This medicine is dispensed without a doctor's prescription

Softa-Man Viscorub
Cutaneous solution

Active ingredients:

Ethanol 45 g/100 ml and propanol 18 g/100 ml

For a list of inactive ingredients and allergens see Section 6.

Read the entire leaflet carefully in its entirety before you start using this medicine. This leaflet contains concise information about this medicine. If you have further questions, refer to your doctor or pharmacist.

To use this medicine, follow the instructions in the dosage section of this leaflet. Consult the pharmacist if you need more information.

1. What is this medicine intended for?

Softa-Man Viscorub is an alcoholic hand disinfectant for hygienic and surgical hand disinfection.

Therapeutic group: skin disinfectant.

When used on skin that is not injured, only very small amounts are absorbed through the skin and they have no effect on your body.

The active ingredients in Softa-Man Viscorub are ethanol and propanol. This medicine is very effective against gram-positive and gram-negative bacteria, including antibiotic-resistant strains (such as the methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* [MRSA]) and mycobacteria. Softa-Man Viscorub works well killing fungi and viruses, and quickly neutralizes rota viruses and viruses that have a sheath.

2. Before using this medicine

Do not use this medicine if:

- You are sensitive (allergic) to the active ingredients ethanol and propanol or to any of the other ingredients that this medicine contains (see Section 6 in this leaflet).

Warnings:

- This medicine is for external use only. Avoid all contact with the eyes and mucous membranes.
- Do not use on injured skin.

Flammable. The solution's flash point is 21°C. Keep away from flame and other sources of ignition.

Do not smoke, do not swallow.

Do not light a cigarette or expose to fire until the product has dried completely.

Consult a doctor, pharmacist, or nurse before you start using the medicine.

If you are taking or have recently taken other medicines, including nonprescription medications and nutritional supplements, tell your doctor or pharmacist.

Do not mix this medicine with other medicines.

Pregnancy and breastfeeding

Pregnancy

There is no information about harmful effects of using Softa-Man Viscorub during pregnancy.

Breastfeeding

There is no information about harmful effects of using Softa-Man Viscorub during breastfeeding.

If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant, or are trying to get pregnant, consult your doctor or pharmacist before using this medicine.

3. How to use this medicine?

For local treatment.

- Apply about 3 ml of undiluted Softa-Man Viscorub onto dry hands.
- Rub into your hands
 - for 30 seconds at least for hygienic hand disinfection
 - for 90 seconds at least for surgical hand disinfection
- Your skin must stay damp for 30 or 90 seconds, respectively, depending on the type of disinfection.
- Allow your skin to dry.
- There is no need to rinse.

Softa-Man Viscorub can be used without first cleaning your hands. If your hands are visibly dirty, clean them first with soap and water.

Do not exceed the recommended dose.

If you accidentally used more Softa-Man Viscorub than you should or if you swallowed some, consult your doctor or pharmacist immediately.

Do not swallow. For external use only.

If an adult or child swallows some of this medicine, they may suffer from acute alcohol poisoning. Large quantities

of this medicine can cause breathing to stop. Loss of consciousness that associated with a risk of choking after vomiting.

- Go immediately to a hospital emergency room for medical care and bring the medicine package with you.
- Do not induce vomiting unless it is recommended by a doctor.

Do not take medicines in the dark! Check the label and dose each time you take the medicine. Wear glasses if you need them.

If you have any further questions about using this medicine, consult your doctor or pharmacist.

4. Side effects

Like all medicines, using Softa-Man Viscorub may cause side effects in some people. Do not be alarmed by this list of side effects. You may not experience any of them.

In rare cases there may be local irritation caused by the alcohol (such as itching or redness) particularly after repeated uses of Softa-Man Viscorub.

Dry skin may occur in rare cases during seasons with low humidity in the air (mainly in the winter). Applying hand cream is advisable in these cases.

If you experience any side effect, if any side effect gets worse, or if you experience a side effect not mentioned in this leaflet, consult your doctor.

You can report side effects to the Ministry of Health by following the link 'Reporting Side Effects of Medication' on the Ministry of Health home page (www.health.gov.il) which links to an online form for reporting side effects. You can also use this link:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. How to store this medicine?

- Prevent poisoning! To prevent poisoning, keep this, and all other medicines, in a closed place out of sight and reach of children and/or infants. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) stated on the bottle. The expiry date refers to the last day of that month.
- You can continue using this medicine for 12 months after first opening the bottle, but do not use it after the expiry date stated on the label. Close the package immediately after opening.
- Store below 25°C.
- Flammable substance! Keep away from sources of fire.

6. Additional information

In addition to the active ingredients, this medicine also contains:

Purified Water, Butanone, Glycerol, Isopropyl Myristate, Cetearyl Ethylhexanoate, Edetol, Octyldodecanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Bisabolol.

What the medicine looks like and what are the contents of the package:

Cutaneous solution, clear to slightly turbid, colorless, viscous, with an alcoholic odor.

The cutaneous solution packaged in 100 ml, 500 ml, and 1000 ml bottles.

The bottles are closed with a cap or a pump dispenser.

Registration Holder: C.W.T - CHRONIC WOUND TREATMENT LTD.,ISRAEL

HAGEFEN 84 ST MOSHAV GIMZO 7313000,ISRAEL

Manufacturer: B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Germany.

This leaflet was reviewed and approved by the Ministry of Health in November 2017.

Registration number of the medicine in the Ministry of Health National Drug Registry: 159-59-35073-00.

في حالات نادرة من المحتوى ظهور تهيج موضعي الذي يحدث نتيجة الكحول (مثل: حكة، إحمرار)، خاصة بعد استعمالات متكررة سويفا - من فيسكوراب.

جفاف في الجلد ممكن أن يظهر في حالات نادرة، في الماء ذات الطبوط المنخفضة (خاصة في الشتاء). يوصى بدهن كريم للدين في حالات كهذه.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير متكررة في النشرة فعليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوالك إلى إستئصال عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر تهويز عبر الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول اليد و المجال رؤية الأولاد وأو الأطفال وهذا تجنب التسمم. لا تنسى التقوير بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) (الظاهر على الملصق التقني). تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.

• هذه الصلاحية بعد فتح القنفنة لأول مرة: 12 شهراً، وليس أكثر من تاريخ انتهاء الصلاحية المسجل على الملصق. يجب إغلاق العبوة فوراً بعد فتحها.

• يجب الحفظ تحت 25°C.

• مادة قابلة للاشتعال! يجب إبعادها عن مصادر نار.

6. معلومات إضافية

• بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Purified Water, Butanone, Glycerol, Isopropyl Myristate, Cetearyl Ethylhexanoate, Edetol, Octyldodecanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Bisabolol.

• كوكوكسول الجلد، صاف - عطر قليلًا، عديم اللون، لزج، مع رائحة كحولية.

المحلول للجلد ممزوج في قناني التي تحتوي على 100 مل، 500 مل و - 1000 مل.

القناني مغلقة بسدادة أو بمضخة توزيع.

• صاحب التسجيل:

C.W.T - CHRONIC WOUND TREATMENT LTD.,ISRAEL

شارع هيفين 84، موشاف جيموز 7313000، إسرائيل

• المنتج: ب. براون ملسونجن AG، ملسونجن، ألمانيا.

• تم تخصيص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ تشرين الثاني 2017.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

159-59-35073-00

• لتيسير قراءة هذه النشرة وتسهيلها، ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.